Hypnum fluminense Hampe, 1875, nom. nud. It, according to Reimers (1937), is a synonym of *Haplocladium microphyllum* (Hedw.) Broth. For this reason, the name *Rudia* Schimp. was considered as a synonym of *Haplocladium* in Index Muscorum, vol. 4 (Wijk et al. 1967). To avoid future confusion, *Bryohaplocladium* appears to be the best name to use in place of *Haplocladium* (C. Muell.) C. Muell.

We thank Prof. M. Chihara of Tsukuba University and Dr. H. Inoue of National Science Museum, Tokyo for informations on *Haplocladium* Naegeli, and also to Dr. A. J. Sharp of University of Tennessee and Dr. S. Hattori of the Hattori Botanical Laboratory for their suggestions.

Literature cited

Farr, E. R., J. A. Leussink, and F. A. Stafleu, 1979. Index Nominum Genericorum (Plantarum), vol. 2, 631-1276. Utrecht. Jaeger, A. 1875. Conspectus systematis generum muscorum omnium quem ex operibus et actis bryologorum. Rev. Bryol. 2(8) : 105-112. Reimers, H. 1937. Die europäischen *Haplocladium*-Arten mit besonderer Berücksichtigung ihrer aussereuropäischen Verbreitung und ihrer Verwandtschaft. Hedwigia **76**: 191-298. Wijk, R. van der, W. D. Margadant, and P. A. Florschütz, 1967. Index Muscorum, vol. 4(P-S), 1-604. Utrecht.

* * * *

コバノキヌゴケ属 (*Haplocladium* C. Muell., 1896) はシノブゴケ科 (Thuidiaceae) の蘚で，13種があり，うち一種 *H. angustifolium* はヨーロッパ，アジア，中南米に広く分布している。この属は東亜でよく分化し，日本には7種がある。近頃になって，この属には先行名 (*Haplocladium* Naegeli, 1862) が紅藻類にあることが判った。このため，蘚類 *Haplocladium* C. Muell. については新学名，*Bryohaplocladium* R. Watanabe et Z. Iwatsuki を用意した。

□角山栄：**茶の世界史** pp. 225. 1980. 中公新書596. 中央公論社,東京. ¥440. 茶の飲用について醗酵の紅茶と，乾燥による緑茶がある。徳川時代のはじめは緑茶がむしろ茶の湯文化と結びついて大いにはやったが，其後鎖国の間にインド大陸に茶業が進展して紅茶の進出となった。それを日中英の三国を中心として論じたもので中々面白い。近時再び緑茶が文化として見直されつつあるかに見える時に描かれたものであるだけに，意味が深い。 (前川文夫)